V Jornada grupo GIDO

GRUPO GIDO

Grup d'Investigació i
Divulgació
en Oncologia

APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS AVANCES MOLECULARES

DE LA INMUNOLOGÍA TUMORAL A LA INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE PULMÓN

José García Sánchez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova

Índice

- **Inmunología tumoral:**

- Relación entre sistema inmune y cáncer: Inmunovigilancia.
- ¿Cómo reconoce el sistema inmune a la célula tumoral?
- ¿Cómo es capaz el sistema inmune de inducir una respuesta anti-tumoral?
- ¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

- **Inmunoterapia en cáncer de pulmón.**

- Activa.
 - Vacunas.
 - Inmunomodulación.
- Pasiva.

Algoritmo terapéutico en CNMP avanzado 2015

Algo de esperanza...

Inmunoterapia de última generación

- Cambio de mentalidad: Dejamos de focalizarnos en el tumor.
- Utilizar los recursos del sistema inmune del paciente para destruir al cáncer:
 - ¿Realidad o ficción?
 - Regresión de tumores sólidos.
 - Tratamiento de amplio espectro tumoral.
 - Respuestas lentas pero duraderas (memoria inmune).
 - Toxicidad diferente pero tolerable.

Sistema de Inmunovigilancia

Elementos de la Respuesta Inmune

Inmunidad Innata

Respuesta inicial y rápida
Inespecífica
No memoria

Inmunidad Adaptativa

Respuesta lenta tras exposición
Específica
Memoria

M1 y M2

Complement protein

Basophil

Eosinophil

Neutrophil

$\gamma\delta$ T cell

T cell

Antibodies

Killer T cell

CD4⁺
T cell

CD8⁺
T cell

Granulocytes

Erase una vez...
la **VIDA**

¿Cómo reconoce el sistema inmune a la célula tumoral?

Antígenos tumorales-CMH tipo I

Específicos de tumor o neoantígenos (TSAs)

- Productos de genes mutados/reordenados.
- Productos de virus oncogénicos.
- Expresión de genes de línea germinal.

ALTA INMUNOGENICIDAD

Asociados a tumor (TAAs)

- Productos de genes disregulados:
 - Expresión anormal (Her2/EGFR).
 - Modificaciones postraduccionales alternativas (glicoproteínas/glicolípidos).
 - Proteínas específicas de tejido.

BAJA INMUNOGENICIDAD

¿Cómo es capaz el SI de inducir una respuesta anti-tumoral?

Fase de activación

CD inmadura
Vigilancia
Captación/procesamiento Ag

Patógenos
Maduración

Ag tumorales
Inflamación

TOLERANCE **IMMUNITY**

Sinapsis inmunológica

Activación del linfocito T por la célula dendrítica

Plasticidad del sistema inmune

Tipos de respuesta inmune

¿Cómo es capaz el SI de inducir una respuesta anti-tumoral? Fase efectora

¿Cómo es capaz el SI de inducir una respuesta anti-tumoral?
Fase efectora: Citotoxicidad dependiente T CD8

Puntos de control inmune

¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

- Ocultar su identidad.
- Atacar directamente al SI.
- Inducir anergia (baja inmunogenicidad).
- Microambiente tumoral inmunosupresor.

¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

Ocultar su identidad (MHC-Ag tumoral)

¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

Ataque directo al SI

¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

Inducción de Anergia (Baja inmunogenicidad)

¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

Microambiente tumoral inmunosupresor

back to the

Índice

- **Inmunología tumoral:**

- Relación entre sistema inmune y cáncer: Inmunovigilancia.
- ¿Cómo reconoce el sistema inmune a la célula tumoral?
- ¿Cómo es capaz el sistema inmune de inducir una respuesta anti-tumoral?
- ¿Cómo evade el cáncer al sistema inmune?

- **Inmunoterapia en cáncer de pulmón.**

- Activa.
 - Vacunas.
 - Inmunomodulación.
- Pasiva.

¿Es el cáncer de pulmón un tumor inmunogénico?

- Tradicionalmente se ha considerado al CPNCP como un tumor NO INMUNOGÉNICO:
 - Fracaso de los tratamientos inmunes tradicionales:
 - Citoquinas (IL-2, INF y BCG).
 - Vacunas.
 - A pesar de:
 - Alta carga mutacional por el efecto carcinogénico del tabaco.
 - Valor pronóstico de infiltrados tumorales linfocitarios.
 - Regresiones tumorales espontáneas relacionadas con la inmunidad.
- Desarrollo del conocimiento de la inmunología tumoral a nivel molecular, de las nuevas tecnología y de nuevas inmunoterapias.

Kataki, J Lab Clin Med 2002
Kuo, Respirology, 1998
Al-Shibli. Clin Cancer Res 2008

Emerging immunotherapy strategy for NSCLC

Inmunomodulación en la fase de activación

Ac monoclonales dirigidos a proteínas de control inmune

Ac antagonistas anti-CTLA en CPNCP: Ipilimumab

Ensayo Fase II aleatorizado

Objetivo primario irPFS

Lynch et al. JCO 2012

Ac antagonistas anti-CTLA en CPNCP: Ipilimumab

Ensayo fase II: Datos de eficacia

Lynch et al. JCO 2012

Inmunomodulación en fase efectora

Ac antagonistas anti-PD1/anti-PDL1

Inmunomodulación en fase efectora (y de activación) Ac antagonistas anti-PD1/anti-PDL1

Anti-PD-L1

Anti-PD-1

Anticuerpos anti-PD1/anti-PDL1 en CPNCP

Datos de eficacia: Fases I Pacientes pretratados

	N	≥ 3 líneas	TRO	SG 1 año
Anti-PD1				
Nivolumab <i>Brahmer ASCO 14</i>	129	54%	Global: 17% 3 mg/kg: 24%	42%
Pembrolizumab <i>Garon ASCO 14</i>	217	2 ^a -3 ^a línea	irRC 18% RECIST 20%	82% respuestas mantenidas (PD-L1+)
Anti-PDL1				
MEDI4736 <i>Brahmer ASCO 14</i>	155	48%	13-16%	Mediana de seguimiento 6 semanas
MPDL3280A9 <i>Soria ECC 13</i>	53		23%	
QT 2^a línea				
Docetaxel			5-10%	20-30%
Pemetrexed				

Anticuerpos anti-PD1/anti-PDL1 en CPNCP

Datos de eficacia: Fases I en 1ª línea (monoterapia)

	N	TRO	TTP	SG 1 año
Nivolumab 3 mg/kg <i>Gettinger ASCO 14</i>	20	30%	9 meses	75% (mOS NR)
Pembrolizumab <i>Rizvi ASCO 14</i>	42	irRC 47% RECIST 26%	irRC 9,2 meses RECIST 6,7 m	-
QT 1ª línea		< 35%	3-6 meses	10-12 meses

Anticuerpos anti-PD1/anti-PDL1 en CPNCP

Datos de seguridad

NIVOLUMAB= 129 *Brahmer, ASCO, 2014*

Category	Treatment-Related Select AE	
	Any Grade, ^b % (n)	Grade 3-4, % (n)
Patients with any treatment-related select AE	41 (53)	5 (6)
Skin	16 (20)	0
Gastrointestinal	12 (15)	1 (1)
Pulmonary	7 (9) ^c	2 (3)
Endocrinopathies	6 (8)	0
Hepatic	5 (6)	1 (1)
Infusion reaction	4 (5)	1 (1)
Renal	3 (4)	0

→ **1 p, grado 5**

PEMBROLIZUMAB *Garon, ASCO, 2014*

Adverse Event, %	10 mg/kg Q2W n = 98		10 mg/kg Q3W n = 119		Total N = 217	
	Any Grade	Grade 3-5	Any Grade	Grade 3-5	Any Grade	Grade 3-5
Any	71	9	58	10	64	10
Fatigue	24	1	16	<1	20	<1
Arthralgia	9	1	8	<1	9	<1
Decreased appetite	10	0	8	0	9	0
Pruritus	7	0	8	0	8	0
Diarrhea	8	0	7	0	7	0
Nausea	7	1	4	0	6	<1
Pyrexia	7	0	6	0	6	0
Rash	6	0	5	0	6	0
Hypothyroidism	8	0	3	0	5	0

**Neumonitis
Grado 3-4 en
4 pacientes**

Anticuerpos anti-PD1/anti-PDL1 en CPNCP

Necesidad de marcadores predictivos de respuesta

- Clínicos:
 - Histología escamosa/no escamosa: No diferencias en TRO con nivolumab (16,7 vs 17,6%) ni con anti-PDL1 MPD3280A (27% vs 21%)
 - Hábito tabáquico: TRO fumadores 26% vs no fumadores 8%
- Moleculares:
 - EGFR/Kras: No diferencias.
 - Expresión PD-L1: Tendencia a mayor respuesta en PD-L1 +.
 - Problemas:
 - Técnicas no estandarizadas.
 - Muestras pequeñas y de diferentes tipos.
 - Determinación en estroma o en tumor.
 - Cambios en la evolución de la enfermedad (rebiopsia).
 - Respuesta en pacientes PD-L1 negativos

Fenotipos de acuerdo al grado de inflamación tumoral

Fenotipo inflamado

- Tratamiento dirigidos a las vías IS:
 - **Anti PD1-PD-L1**
 - Pequeñas moléculas inhibitoras de IDO
 - Tratamientos anti CD25 (T_{reg})

Fenotipo no inflamado

- Pobre secreción de citoquinas e infiltración linfocitaria
- Mínima presencia de vías inmunosupresoras
- Mayor densidad del estroma.

Futuro

Combinación de terapias

Combinación de terapias

Quimioterapia + Ac anti-PD-1 (Nivolumab)

Combinación de terapias

Tratamiento diana (EGFR TKI) + Inmunoterapia anti-PD-1

Safety and Response With Nivolumab (Anti-PD-1; BMS-936558, ONO-4538) Plus Erlotinib in Patients With Epidermal Growth Factor Receptor Mutant Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Naizer A. Rizvi,¹ Laura O. Chow,² Hossain Borghaei,³ Yun Shen,⁴ Christopher Harbison,⁴ Sunish Alaparthi,⁴ Allen C. Chen,⁵ Scott Gettinger⁶

¹Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; ²University of Washington, Seattle, WA, USA; ³The Cancer Center, Philadelphia, PA, USA; ⁴Novartis, East Hanover, NJ, USA; ⁵Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA

Datos de eficacia y seguridad	Erlotinib + Nivolumab (n=21)
TRO	19% (4)
mSLP	7,3 meses
SG al año	73%
Toxicidad G3	24% (5)
Interrupción del tratamiento por toxicidad	19% (4)

Rizvi ASCO 2014

Combinación de terapias

Ac anti-CTLA4 + Ac anti-PD-1

Nivolumab (Anti-PD-1; BMS-936558, ONO-4538) and Ipilimumab in First-Line Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): Interim Phase 1 Results

Scott J. Antonia,¹ Scott Gettinger,² Laura Q. Chow,³ Rosalyn Juergens,⁴ Hossein Borghaei,⁵ Yun Shen,⁶ Christopher Harbison,⁶ Allen C. Chen,⁶ Neal E. Ready,⁷ Naiyer A. Rizvi⁸

Chemotherapy-naïve patients with stage IIIB or IV NSCLC

Datos de eficacia y seguridad	Ipilimumab + Nivolumab (n=49)
TRO	11-33%
SLP a las 24 semanas	33-44%
SG al año	44-65%
Toxicidad global	88%
Toxicidad G3/4	49%
Interrupción del tratamiento por toxicidad	37% (fase de inducción)

Criterios de evaluación de la respuesta inmune

4 patrones de respuesta distintos

Cambios potenciales en la carga tumoral según irRC				
Mayoría de los pacientes con respuesta	Respuesta convencional
	Reducción lenta y progresiva de la carga tumoral
Minoría de los pacientes con respuesta	Respuesta tardía tras la progresión inicial
	Aparece una lesión nueva y después se reduce al mismo tiempo que la lesión diana
		Inicio	12 semanas Primera evaluación	Evaluaciones posteriores

< 5%

Conclusiones

- El mejor conocimiento a nivel molecular de la inmunología tumoral ha permitido el desarrollo de una inmunoterapia de alta eficacia.
- Amplio espectro antitumoral.
- Respuestas prolongadas que pueden mejorar la supervivencia a largo plazo.
- Toxicidad diferente pero manejable.
- Criterios de respuesta específicos (irRC)
- Posibilidad de combinación con terapias estándar.
- Necesidad de biomarcadores de respuesta inmune.
- Aproximación prometedora que tendrá que ser validada en ensayos fase III.

Cambios potenciales en la carga tumoral según irRC					
Mayoría de los pacientes con respuesta	Respuesta convencional
	Reducción lenta y progresiva de la carga tumoral
Minoría de los pacientes con respuesta	Respuesta tardía tras la progresión inicial
	Aparece una lesión nueva y después se reduce al mismo tiempo que la lesión diana
		Inicio	12 semanas Primera evaluación	Evaluaciones posteriores	

< 5%

Cambios potenciales en la carga tumoral según irRC					
Mayoría de los pacientes con respuesta	Respuesta convencional
	Reducción lenta y progresiva de la carga tumoral
Minoría de los pacientes con respuesta	Respuesta tardía tras la progresión inicial
	Aparece una lesión nueva y después se reduce al mismo tiempo que la lesión diana
		Inicio	12 semanas Primera evaluación	Evaluaciones posteriores	

< 5%

Cambios potenciales en la carga tumoral según irRC					
Mayoría de los pacientes con respuesta	Respuesta convencional
	Reducción lenta y progresiva de la carga tumoral
Minoría de los pacientes con respuesta	Respuesta tardía tras la progresión inicial
	Aparece una lesión nueva y después se reduce al mismo tiempo que la lesión diana
		Inicio	12 semanas Primera evaluación	Evaluaciones posteriores	

< 5%

Cambios potenciales en la carga tumoral según irRC					
Mayoría de los pacientes con respuesta	Respuesta convencional
	Reducción lenta y progresiva de la carga tumoral
Minoría de los pacientes con respuesta	Respuesta tardía tras la progresión inicial
	Aparece una lesión nueva y después se reduce al mismo tiempo que la lesión diana
		Inicio	12 semanas Primera evaluación	Evaluaciones posteriores	

< 5%